

Imię i nazwisko

PESEL

Data wykonania oceny

SKALA GLASGOW^{*)}

Lp.	Ocenie podlega	Wynik
1.	Otwieranie oczu 4 punkty – spontaniczne 3 punkty – na polecenie 2 punkty – na bodźce bólowe 1 punkt – nie otwiera oczu	
2.	Kontakt słowny 5 punktów – odpowiedź logiczna, pacjent zorientowany, co do miejsca, czasu i własnej osoby 4 punkty – odpowiedź splątana, pacjent zdeorientowany 3 punkty – odpowiedź nieadekwatna, nie na temat lub krzyk 2 punkty – niezrozumiałe dźwięki, pojękiwanie 1 punkt – bez reakcji	
3.	Reakcja ruchowa 6 punktów – spełnianie ruchowych poleceń słownych, migowych 5 punktów – ruchy celowe, pacjent lokalizuje bodziec bólowy 4 punkty – reakcja obronna na ból, wycofanie, próba usunięcia bodźca bólowego 3 punkty – patologiczna reakcja zgięciowa, odkorowanie (przywiedzenie ramion, zgięcie w stawach łokciowych i ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych) 2 punkty – patologiczna reakcja wyprostna, odmóżdzenie (odwiedzenie i obrót ramion do wewnątrz, wyprost w stawach łokciowych, nawrócenie przedramion i zgięcie stawów ręki, przeprost w stawach kończyn dolnych, odwrócenie stopy) 1 punkt – bez reakcji	
Ocena GSC		Łączna suma punktów:
4.	Uwzględnia się najlepszą uzyskaną odpowiedź w każdej kategorii. Łącznie można uzyskać od 3 do 15 punktów, ale należy zaznaczyć z jakich składowych powstał wynik (np. GCS 12: 3/4 + 4/5 + 5/6).	
5.	Na podstawie skali Glasgow zaburzenia przytomności dzieli się na: - GCS 13–15 – łagodne - GCS 9–12 – umiarkowane - GCS 6–8 – brak przytomności - GCS 5 – odkorowanie - GCS 4 – odmóżdzenie - GCS 3 – śmierć mózgowa Skala Glasgow może być stosowana u dzieci, które już dobrze mówią, tj. od 4 roku życia	

data, pieczęć, podpis lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

albo lekarza zakładu opiekuńczo-leczniczego

^{*)} opracowanie własne na potrzeby ZOL zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ Nr 45/2018/DSOZ